

TWENTY 1 WP

Insekticíd TWENTY 1 WP proti muchám v objektoch živočíšnej výroby.

INSEKTICÍD PRE POUŽITIE V OBJEKTOCH ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY PROTI MUCHÁM, PREDOVŠETKÝM MUCHE DOMÁCEJ (MUSCA DOMESTICA A FANIA CANICULARIS) URČENÝ K APLIKÁCII DO MIEST, KDE SA MUCHY HOJNE VYSKYTUJÚ A MIMO DOSAHU ZVIERAT.

Čas potrebný na biocídny účinok: okamžitý

Doba pôsobenia je 6 týždňov (42 dní) po aplikácii podľa návodu.

Aplikácia a dávkovanie:

Je veľmi dôležité aplikovať prípravok na plochy, kde sa muchy hojne vyskytujú a ktoré ich lákajú k usadnutiu. Odporúča sa pred aplikáciou vysledovať tieto vhodné miesta.

POSTREKOVANIE: Na ošetrenie objektu s podlahovou plochou 100 m² zriedte 250 g Twenty 1 WP v 2 litroch vlažnej vody. Dôkladne miešajte až získate homogénny roztok. Postrekujte plochy, na ktoré muchy sadajú, najmä okná, stropy, horné časti stien, potrubia...

NATIERANIE: Na ošetrenie objektu s podlahovou plochou 100 m² zriedte 250 g Twenty 1 WP v 250 ml vlažnej vody. Dôkladne miešajte až do vytvorenia dostatočne tekutej konzistencie, ktorá môže byť aplikovaná štetcom. Takto pripravený Twenty 1 WP natierajte na najmenej 30 miest o približnej veľkosti 20x30 cm na miesta s hojným výskytom múch, napríklad na slnečné plochy, okenné rámy, potrubia, vonkajšie strany žľabov... Neaplikujte Twenty 1 WP na čerstvo nabielené steny alebo na porézne povrchy.

NATIERANIE NA ŽLTÉ PANEĽY: Na ošetrenie objektu s podlahovou plochou 100 m² zriedte 250 g Twenty 1 WP v 80 ml vlažnej vody. Dôkladne miešajte až získate homogénny roztok. Pre maximálny účinok natierajte roztok na panely v rovnomerne od seba vzdialených pruhoch.. Účinok možno znova aktivovať postrekom vlažnou vodou. Panely zavesíte na miesta s hojným výskytom múch. Panely umožňujú použitie Twenty 1 WP na miestach, kde je bežná aplikácia obtiažna (porézne povrchy, hradenia...), ďalej poskytujú dobrú priestorovú distribúciu (panely môžu byť zavesené v strede objektov).

Prázdne obaly a zvyšky po použití

Znehodnoťte obal a zneškodnite ho v súlade s regionálnymi predpismi. Obal nesmie byť v žiadnom prípade opätovne použitý na iné účely. Zvyšky po použití 10-násobne rozriedte a podľa návodu naneste na už ošetrené plochy. Zabráňte kontaminácii rybníkov, vodných tokov a kanálov prípravkom alebo prázdny obalom. Na zabránenie akýchkoľvek zvyškov po použití je potrebné čo najlepšie vypočítať množstvo prášku na prípravu, pripravované množstvo alebo aplikované množstvo, v závislosti na ošetrovanej ploche. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo iné priame či nepriame škodlivé vplyvy, ktoré môžu vzniknúť počas prepravy, uskladnenia, použitia a z dôvodu spôsobu aplikácie našich výrobkov.

UPOZORNENIE:

H332	Škodlivý pri vdýchnutí.	
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.	
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.	
P261	Zabráňte vdychovaniu prachu.	
P280	Noste ochranné rukavice.	
P273	Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.	
P272	Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.	
P321	Odborné ošetrovanie (pozri na etikete).	
P302+P352	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.	
P333+P313	Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.	
P391	Zobierajte uniknutý produkt.	
P362+P364	Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.	
P501	Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. Zákaz opakovaného použitia obalu.	

Pokyny pre prvú pomoc

Postihnutého preneste na vetrané miesto alebo von, ochráňte ho pred chladom. V prípade podozrenia z otravy okamžite privolajte lekársku pomoc. Pri styku s pokožkou odstráňte kontaminovaný odev a zasiahnuté časti tela dobre umyte vodou a mydlom. V prípade zasiahnutia očí: niekoľko minút vyplachujte čistou vodou a okamžite privolajte lekársku pomoc. V prípade požitia podajte viackrát medicínálne uhlie a veľké množstvom vody. Nevývolávajte zvracanie a nepodávajte nič ústami.

Údaje pre lekára

Inhibitor cholinesteráz. Atropín musí byť podávaný pod lekárske dozorné oko ako antidot. Dospelí: každých 5 až 10 minút 2 až 4 mg atropín sulfátu IV alebo IM (až po dosiahnutie príznakov atropinizácie).

Deti: 0.5 až 2 mg v závislosti na veku dieťaťa. Pacient musí byť potrebný čas pod atropínom (24 až 48 hodín), aby sa zabránilo dodatočnej intoxikácii z dôvodu neskoršieho vstrebania.

V prípade potreby liečbu postihnutého môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Pracovisko Nemocnice akad. L. Déreza, Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. číslo: 02 547 74 166.

FORMULÁCIA: prášok na zriedenie

REGISTRAČNÉ ČÍSLO: bio/592/D/15/CCHLP

Spotrebujte do: 5 rokov od dátumu výroby

BALENIE: 500 g

ÚČINNÁ LÁTKA: azametifos >95% (100 g/kg)

ČÍSLO ŠARŽE / DÁTUM VÝROBY: uvedené na obale



VÝROBCA: BELGAGRI SA

DISTRIBÚTOR:

EKOLAS SK, s.r.o., Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Telefón: +421 (0)33 559 20 96, www.ekolas.sk, info@ekolas.sk